

**Januari 2011**

## **Afwijkend cervix uitstrijkje**

### **Algemeen**

CIN-poli: In twee (soms 3) polibezoeken vinden diagnostiek en liexcisie plaats.

Tijdens het eerste polibezzoek: geeft de verpleegkundige informatie over de behandeling. Eén week later vindt de diagnostiek (colposcopie, echo en biopt) plaats. Indien nodig wordt een liexcisie verricht.

### **Verwijsvoorwaarden:**

- macroscopisch verdachte afwijking van de portio
- $\geq$  PAP IIIA2 bij eerste uitstrijkje <sup>\*1</sup>
- $>$  (tweemaal) PAP II

### **Huisarts**

*Diagnostiek:*

Uitstrijkje

*Info aan specialist:*

Verwijst via Zorgdomein; in brief wordt vermeld:

- Anamnese: contactbloedingen, cyclusafwijkingen,
- postmenopauze, familiair voorkomen gynaecologische afwijkingen
- Onderzoek: afwijkende bevindingen
- Voorgeschiedenis (gyn) en co-morbiditeit
- Overgevoeligheid/allergie
- Medicatie
- Uitslag uitstrijk(jes) OF op papier meegeven met patiënte

### **Patiënt**

*Info aan patiënt:*

- De poli neemt telefonisch contact op met patiënte.
- Bij geen gehoor alleen brief.
- Brief met bevestiging afspraak en een voorlichtingsbrochure over afwijkende uitstrijkjes en CIN spreekuur wordt thuisgestuurd.
- Afspraak binnen 2 weken na verwijzing van de huisarts.
- De uitslag van het uitstrijkje meenemen naar de poli.
- Voorbereiding: Voorlichtingsbrochure lezen

### **Gynecoloog :**

*Info aan huisarts:*

Brief binnen 2 weken na behandeling

## Procedureafpraak GYNAECOLOGIE | UITSTRIJKJE

\*1 Verwijscriteria NHG

1. Macroscopisch verdachte afwijking van de portio
2. Classificatie PAP IIIA2 of hoger ( >P4 / >A3 / >C5 ) bij eerste uitstrijk
3. Herhalingsuitstrijkje met geringe afwijking: PAP II of PAP IIIA1 (P2-4/A3/C3-5), na eerder uitstrijkje met geringe afwijking

<b>PAP klasse 1e uitstrijk/KOPAC</b>	<b>Herhalingsadvies</b>	<b>Vervolgadvies</b>
<b>PAP I</b> = P1, A1-2, C1	Herhaling door eerstvolgende BVO oproep (= conform CBO richtlijn)	Geen
<b>PAP II</b> = P2-3, C3	Herhaling na 6 maanden (= conform CBO richtlijn/NHG)	<i>Normaal:</i> herhaling na 12 maanden <i>Afwijkend:</i> - PAP II: consult gynaecoloog - > dan PAP II: naar CIN poli
<b>PAP IIIA1</b> = P4, A3, C4-5	Herhaling na 6 maanden (= conform CBO richtlijn/NHG)	<i>Normaal:</i> herhaling na 12 maanden <i>Afwijkend:</i> verwijzing CIN-poli
<b>PAP IIIA2 en hoger</b> = hoger dan P4, A3, C5	Verwijzing CIN-pol (= conform CBO richtlijn)	