

November 2011 **Reumatologie / JICHT: EENMALIG CONSULT VOOR DIAGNOSTISCHE PUNCTIE**

| | |
|--|---|
| Algemeen | Het aantonen van uraatkristallen d.m.v. een diagnostische gewrichtspunctie wordt beschouwd als gouden standaard voor de diagnose jicht ^{*1} . <i>Het is mogelijk deze diagnostische handeling uit te besteden aan de reumatoloog.</i> |
| Verwijsvoorwaarden | Diagnostische onzekerheid bij een monoartritis verdacht voor jicht. |
| Huisarts | Belt de dienstdoende reumatoloog tel. 033-8505050. In onderling overleg wordt een tijdstip voor de punctie bepaald. Dit is indien mogelijk de dag van de aanval, of uiterlijk de eerste daarop volgende werkdag. |
| Info aan de specialist | Korte verwijsbrief meegeven aan de patiënt met daarin de personalia, de indicatie en het medicijngebruik (met name bloedverdunners). |
| Patiënt Info aan de patiënt | Uitleg over het doel van de punctie bevestigen of verwerpen van diagnose jicht). Het betreft géén polikliniekbezoek: de huisarts bepaalt het verdere beleid. |
| Specialist Info aan de huisarts | <ul style="list-style-type: none">○ Verricht de punctie en beoordeelt het punctaat.○ Geeft de patiënt per omgaande schriftelijk bericht mee, die dit vervolgens aan de huisarts geeft. |

Noten:

- *1 In de NGH standaard jicht staat de gewrichtspunctie als gouden standaard vermeld (NHG-standaard Jicht M7).