

## December 2010 Urologie | LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS LUTS

<b>Algemeen</b>	De huisarts start met medicatie bij benigne prostaathypertrofie en laat voor de verwijzing: PSA, Hb, kreat en urineonderzoek bepalen
<b>Verwijscriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Mictieklachten t.g.v. benigne prostaathypertrofie niet reagerend na 3 maanden medicamenteuze behandeling</li></ul>
<b>Excluscriteria</b>	Indien er sprake is van urineretentie, zie in zorgdomein verwijsredenen niet gespecificeerd /overige- urine retentie man.
<b>Huisarts</b>	Verwijst via zorgdomein en vermeldt in de brief:
<b>Info aan de specialist</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Omschrijving klachten (verwijsvoorwaarden) en vraagstelling</li><li>○ Rectaal Toucher</li><li>○ Voorgeschiedenis</li><li>○ Medicatie</li><li>○ PSA, Hb en kreat vermelden in verwijsbrief indien de waarden niet in Meander MC bepaald zijn.</li></ul>
<b>Info aan de patiënt</b>	Zelf afspraak maken 033-8506070 en zorgdomein nummer doorgeven
<b>Uroloog</b>	Geeft specifieke informatie over alle behandelingsmogelijkheden

### RETOURINFORMATIE

Brief wordt elektronisch binnen 3 weken na afronding van het onderzoek verzonden. Indien de uroloog medicatie heeft voorgeschreven dan wordt de duur van de medicamenteuze behandeling in het retourbericht vermeld.